

IMPAKTIT

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

DOBRY I BEZPIECZNY WYBÓR

na słabsze stanowiska glebowe

WYSOKA ENERGETYCZNOŚĆ KISZONKI

Netto Energia Laktacji (NEL) – 7,1 MJ/kg s.m. – jedna z najwyższych wartości w doświadczeniach Development LIDEA

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Stay green: **mocny**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
NORMA SIEWU		
80 000	83 000	90 000

DYSTRYBUCJA



Elmar Pro

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA



Typ mieszańca
trójliniowy (TC)


Typ ziarniaka
flint

Rejestracja
EU 2022

Suma temperatur efektywnych

- Kwitnienie: 880°C
- Kiszonka 32% s.m.: 1450°C


UŻYTKOWANIE KISZONKOWE



PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy oraz zawartość suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % s.m.). Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2022 r. Grupa średniowczesna.

NR 2 NAJWYŻSZY
PLON S.M.
CCA 2022
GR. ŚREDNIOWCZESNA



Wzorzec: 218,4 dt/ha = 100%
Impaktit: 223,4 dt/ha = 102%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK 2022.