

KATALOG 2027

KUKURYDZA



20 *years* **TROPICAL DENT®**
Lidea

54
odmiany
zarejestrowane
w Polsce

29 * nr 1.
w oficjalnych
doświadczeniach
COBORU

co 9. ha
kukurydzy ziarnowej
obsiany odmianami
Lidea Tropical Dent®

Lidea



Lidea jest ekspertem w hodowli odmian kluczowych roślin rolniczych w Europie. Sukces plonów rozpoczyna się od jakości nasion, a nasze odmiany roślin uprawnych oferują wysokie i stabilne plony nawet w trudnych warunkach glebowo-klimatycznych.

OFERTA NASION LIDEA



www.lidea-seeds.pl

SPIIS TREŚCI

- 4** Tropical Dent® – 20-lecie odkrycia przełomowej genetyki Lidea
- 6** Boost&Go – ochrona i biostymulacja nasion
- 9** Yield Profile®
- 10** Nitro Boost

ODMIANY NA ZIARNO

- 12** LID1145C FAO 210
- 13** HEMINGSTONE FAO 220
- 14** LID1015C FAO 220
- 15** FRIENDLI CS FAO 220
- 16** IBARAMA FAO 230
- 17** LID1033C FAO 230
- 18** LID1447C (LDZ25160) FAO 230
- 19** ROCHESTER FAO 230
- 20** CS LUXURI FAO 230
- 21** LID1244C FAO 230-240
- 22** CHIANTI CS FAO 240
- 23** ES CREATIVE FAO 240
- 24** IBEMA FAO 240 • NOWOŚĆ
- 25** ES INVENTIVE FAO 240
- 26** KEYSTONE FAO 240
- 27** LID2020C FAO 240
- 28** LID2123C FAO 240
- 29** LID2210C FAO 240
- 30** LID2214C FAO 240
- 31** LID2233C FAO 240 • NOWOŚĆ
- 32** LID2288C FAO 240
- 33** MOONFIELD (LDZ25290) FAO 240 • NOWOŚĆ
- 34** TONIFI CS FAO 240
- 35** ROCKHAMPTON FAO 240
- 36** ARBORI CS FAO 240-250
- 37** GRIGRI CS FAO 240-250
- 38** KINGSTONE FAO 240-250
- 39** LID2404C FAO 240-250
- 40** OKLAHOMA FAO 240-250 • NOWOŚĆ
- 41** LID2155C FAO 250
- 42** REDFORD FAO 250

- 43** ES HATTRICK FAO 260
- 44** LID2334C FAO 260
- 45** LID3306C FAO 260
- 46** LID3355C (LDZ25364) FAO 260 • NOWOŚĆ
- 47** ES MYLADY FAO 270
- 48** LID3223C FAO 270
- 49** WINTERSTONE FAO 270
- 50** LID4040C FAO 280
- 51** LID4111C FAO 280
- 52** LID4320C FAO 290 • NOWOŚĆ

ODMIANY UNIWERSALNE

- 53** CS SOREMI FAO 240
- 54** GREYSTONE FAO 240-250

ODMIANY NA KISZONKĘ

- 55** FIELDPLAYER FAO 230
- 56** ES JOKER FAO 240
- 57** LID2929C (LDZ24269) FAO 240 • NOWOŚĆ
- 58** ES ISLANDER FAO 240-250
- 59** LID2775C (LDZ25285) FAO 240-250 • NOWOŚĆ
- 60** LID2888C FAO 240-250
- 61** IMPAKTIT FAO 250
- 62** BAObI CS FAO 250-260
- 63** CS KISSMI FAO 250-260
- 64** ES SKYTOWER FAO 250-260
- 65** ROLLINGSTONE FAO 250-260
- 66** CS ALCHIMI FAO 260
- 67** LID3620C FAO 260
- 68** LID3641C (LDZ23345) FAO 260 • NOWOŚĆ
- 69** BELLWOOD FAO 260-270
- 70** LID3910C FAO 270
- 71** OVERSTONE FAO 270
- 72** POESI CS FAO 270
- 73** NAOMI CS FAO 280 • NOWOŚĆ
- 74** Spis odmian kukurydzy



Odmiany Tropical Dent® to połączenie pozytywnych cech odmian kukurydzy z ziarnem typu flint z plennością i szybkim oddawaniem wody odmian z ziarnem typu dent.

PLON — STABILNOŚĆ — DOSYCHANIE

Dowody sukcesu TROPICAL DENT®

54

odmiany zarejestrowane
w krajowym rejestrze

29 * nr 1.

w doświadczeniach COBORU*

*doświadczenia rejestrowe, PDO i rozpoznawcze

co 9. ha

kukurydzy ziarnowej w Polsce obsiany
odmianami Lidea Tropical Dent®

Oryginalność genetyki TROPICAL DENT®

Unikalna genetyka kukurydzy ziarnowej łącząca wszystkie zalety ważne dla rolnika – PLON, STABILNOŚĆ i SZYBKIE DOSYCHANIE ziarna na polu, jak i oddawanie wody przy dosuszaniu.

Zakres wczesności: od bardzo wczesnej do późnej.

Przydatność do produkcji wysokiej jakości ziarna i paszy.



Grupa genetyczna Tropical Dent® firmy Lidea jest unikalna. Jej pochodzenie różni się od innych grup genetycznych dostępnych na rynku kukurydzy, Odmiany są doskonale dopasowane do polskich warunków klimatycznych, gwarantując najwyższy plon oraz niską wilgotność zbieranego ziarna

Ta droga zaczęła się 20 lat temu *i nadal trwa*

Decyzja o poszukiwaniu nowego modelu selekcji kukurydzy

Badania nad efektem heterozji w celu maksymalizacji plonu



1990

Odkrycie nowego źródła genetycznego – kukurydzy TROPICAL DENT®

Praca nad wprowadzeniem nowych materiałów do schematu hodowlanego



2006

Rejestracja pierwszej odmiany TROPICAL DENT® – ES Palazzo

Rekordowe wyniki rejestracyjne COBORU



2009

3. Generacja TROPICAL DENT®

Udoskonalenie cech agronomicznych

Odmiany flagowe:

- ES MYLADY
- LID2210C
- LID3306C




2022

2. Generacja TROPICAL DENT®

Przystosowanie do warunków stresowych

Odmiany flagowe:

- ES PERSPECTIVE
- ES INVENTIVE
- ES FARADAY



2017

1. Generacja TROPICAL DENT®

Wysoki potencjał plonowania

Odmiany flagowe:

- ES PALAZZO
- ES CONCORD
- ES COCKPIT



2009-2013

Lidea numerem 2.* w genetyce ziarnowej w Polsce

Od 2013 roku udoskonalamy i poprawiamy nasze odmiany kukurydzy, wykorzystując cechy naszej unikalnej rodziny genetycznej Tropical Dent®. Wynikiem jest zespół odmian mieszańcowych o doskonałych właściwościach użytkowych, które spełniają potrzeby i oczekiwania rolnika uprawiającego kukurydzę.

* Źródło: Kynetek, FarmTrak Seed, 2025.



2026

Boost&Go

Lidea

KAŻDY POTENCJAŁ
STAJE SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ

OCHRONA I BIOSTYMULACJA

Zmiany klimatyczne, restrykcyjne przepisy dotyczące zapraw nasiennych, chwasty, straty powodowane przez choroby i ptaki – wszystkie te czynniki mogą mieć poważny wpływ na kukurydzę i znacznie limitować plonowanie.



LIDEA przedstawia innowacyjne rozwiązanie chroniące rośliny od najwcześniejszych stadiów rozwoju: Boost&Go to 4-składnikowa zaprawa nasenna zabezpieczająca roślinę od momentu siewu.



OTOCZKA POLIMEROWA

zapewnia lepsze pokrycie nasion i ogranicza powstawanie pyłu



BIOSTYMULANT

w celu aktywacji metabolizmu roślin i polepszenia wigoru siewek oraz tworzenia biomasy



MIKROELEMENTY

ułatwiają szybkie i wyrównane wschody



OCHRONA I ZABEZPIECZENIE*

w fazie kielkowania oraz wschodów

* Dostępna zaprawa fungicydowa i insektycydowa w zależności od wybranej opcji.

KORZYŚCI



Szybkie
kielkowanie



Wyrównane
wschody



Pełna **ochrona** roślin od początku wzrostu



Ochrona potencjału genetycznego

UDOWODNIONE DZIAŁANIE




**OBSADA
ROŚLIN**

Zwiększona
nawet o **+10%***



**POWIERZCHNIA
LIŚCI**

Większy rozwój biomasy
we wczesnych stadiach
(3-7 liści) **+7%***




**INTENSYWNOŚĆ
FOTOSYNTEZY**

Dzięki biostymulacji metabolizmu azotu – do **+14%***
większa powierzchnia liści (indeks NDVI) w fazie 8-10 liści.

* w porównaniu do kontroli bez zaprawy Boost&Go
Źródło: sieć doświadczalna Lidea, 2021

> Działanie ochronne we wczesnych fazach



OCHRONA

ZAPRAWA

KOMPOZYCJA SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH

BIOSTYMULANT

> Lepiej rozwinięty system korzeniowy

Mateuszewo, wielkopolska, 2023



Boost&Go
Lidea

Redigo M



Boost&Go
Lidea

Redigo M

> Większa wytworzona biomasa roślinna

Mórka, wielkopolska, 2023



Boost&Go
Lidea



Redigo M

> Pomiar pokrycia gleby przez liście

Aplikacja Canopeo - analizująca zdjęcia polowe i wyrażająca wartość pokrycia gleby przez liście [%].

W 7 lokalizacjach wysiano odmiany LIDEA zaprawione standardową zaprawą oraz zaprawą Boost&Go.

Następnie za pomocą aplikacji Canopeo wykonywano pomiar w postaci % indeksu pokrycia gleby przez liście roślin. Wyniki porównywano ze sobą dla tych samych odmian i lokalizacji.

* Wyniki procentowe wariantów standard oraz Boost&Go są współczynnikami pokrycia gleby. Dlatego różnica pomiędzy wariantami nie jest wyrażana w punktach procentowych lecz w procentach.




Przykład: stąd różnica dla Chianti CS w widocznym przykładzie to nie 7,92% (35,02% - 27,10%), lecz 29% (35,02 / 27,10 = 129%).



Chianti CS



ES Katamaran



Dzięki nasionom zaprawionym **Boost&Go Lidea**

wigor roślin jest mocniejszy o prawie **10%**


Krośniewice (8)	Manasterz (2)	Mateuszewo (1)	Mórka (15)	Rudniki (8)	Krasnystaw (2)	średnio
+1,75%	+15,31%	+94,51%	+21,63%	+15,58%	+8,71%	+33,55%
			17.05	26.05		+9,63%

Yield Profile®


Sposób na najtrafniejsze dopasowanie odmiany do pola.
Oparty na faktycznych danych z 260 lokalizacji doświadczalnych w całej Europie

Uprawiasz kukurydzę na słabej, piaszczystej glebie
(klasa V) z okresowym niedoborem wody.


Którą odmianę wybrać?



Wysokowydajna, bardzo dobra na najlepszych glebach, nie radzi sobie na glebach najsłabszych.



Uniwersalna, najlepsza na gleby średnie i dobre. W ekstremalnie słabych warunkach może mieć problemy.



Dobra na średnich i lepszych stanowiskach. Doskonale radzi sobie na najsłabszych i problematycznych glebach.

Wybór wydaje się jasny: Odmiana C najlepiej spełni Twoje oczekiwania.

Szczegółowe wyjaśnienie Yield Profile®

SKĄD CZERPIEMY NASZĄ WIEDZĘ?

Każdą odmianę kukurydzy badamy w ramach sieci 260 lokalizacji doświadczalnych w całej Europie.

Oto wyniki badań odmiany LID2155C


Stanowisko	Plon historyczny [dt/ha]	Liczba doświadczeń	Plon LID2155C wzgl. średniej [%]
słabe	<90	11	105,8
średnie	90-120	27	103,3
dobre	>120	48	103,4

Na stanowiskach słabych, gdzie średni plon ziarna wszystkich odmian wynosił 83,2 dt/ha, LID2155C uzyskała 88,0 dt/ha, co daje wynik 105,8% średniej.

Na stanowiskach średnich, przy średnim plonie ziarna 109,3 dt/ha, plonowała na poziomie 112,9 dt/ha, osiągając 103,3% wzorca.

Na stanowiskach dobrych, gdzie średnia wyniosła 138,4 dt/ha, osiągnęła plon 143,1 dt/ha, co dało wynik 103,4% średniej.

Wniosek: Wyniki te jednoznacznie potwierdzają, że LID2155C to odmiana uniwersalna, stabilnie plonująca powyżej średniej w każdych warunkach.



Wybierz odmianę LIDEA w oparciu o Yield Profile®
i ciesz się sukcesem na Twoim polu!

Yield PROFILE®



Nitro Boost Lidea

**MNIEJSZE
DAWKI AZOTU**

**BARDZIEJ
AKTYWNE
ŻYCIE
GLEBOWE**

**PODWÓJNE
DZIAŁANIE**

—
Wiązanie azotu
atmosferycznego
Wzmocnione
pobieranie
azotu przez rośliny

**EFEKT
BIOSTYMULACJI**

—
Wzmocniony
rozwój korzeni
Mocny wczesny
wigor roślin

**ZDROWIE
BIOLOGICZNE
GLEBY**

—
Wzrost
bioróżnorodności
Wzmocniona
aktywność
biologiczna gleby
Zaprawa zawierająca
wyselekcjonowane
bakterie *Bacillus
velezensis* wiążące
azot z powietrza



**ŻYWE POŁĄCZENIE
POMIĘDZY GLEBĄ I POWIETRZEM**

Lidea

Zeskanuj, żeby dowiedzieć się więcej
lidea-seeds.pl



DOSTĘPNY WKRÓTCE

Uzyskuj satysfakcjonujące plony
redukując dawkę azotu z Nitro Boost Lidea



Wysiej odmianę

IBARAMA

w zaprawie Nitro Boost

Zaoszczędź nawet 20 do 40 kg
azotu na hektar!

**NR 1 NAJWYŻSZY
PLON ZIARNA**

PDO 2025
GR. WCZESNA

**NR 1 NAJWYŻSZY
PLON ZIARNA**

PDO 2024
GR. WCZESNA

**NR 1 NAJWYŻSZY
PLON ZIARNA**

DOŚW. REJESTROWE 2022-2023
GR. WCZESNA





LID1145C

ODMIANA Wczesna



KORZYŚCI

NAJWCZESNIEJSZA ODMIANA ZIARNOWA
również do późnych siewów

**DO UPRAWY RÓWNIŻ NA SŁABSZYCH
GLEBACH**

ODMIANA UNIWERSALNA
nadaje się również na kiszonkę

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Dosychanie ziarna: **b. szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
100%	102%	102%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	90 000

DYSTRYBUCJA



Agrii Polska

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
PL 2023

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 890°C; ziarno 32% H₂O: 1660°C

Genetyka Tropical Dent®



STRUKTURA PLONU



Rzędy/kolbę
14-16


Ziaren/rząd
32-34

MTZ
340

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, lata 2021-2022. Grupa wczesna.

**NR 1 NAJWYŻSZY
PLON ZIARNA**
DOŚW. REJESTROWE 2022
GR. WCZESNA



Wzorzec: 121,1 dt/ha = 100%
LID1145C: 128,3 dt/ha = 106%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, lata 2021-2022.

HEMINGSTONE

ODMIANA Wczesna



KORZYŚCI

DOSKONAŁE DOPASOWANIE

do słabszych stanowisk glebowych

SZYBKIE ODDAWANIE WODY Z ZIARNA

MOCNE I ZDROWE ROŚLINY

niepodatne na złamania

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **b. szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **b. tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
108%	101%	102%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	82 000

DYSTRYBUCJA



BAT Agrar

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA


Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
flint-dent

Rejestracja
EU 2025
Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 880°C; ziarno 32% H₂O: 1650°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PŁONU



 Rzędy/kolbę
16-18

 Ziaren/rząd
30-32

 MTZ
306

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, lata 2023-2024. Grupa wczesna.



Wzorzec: 128,3 dt/ha = 100%

Hemingstone (LD23117): 126,6 dt/ha = 99%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, lata 2023-2024.

LID1015C

ODMIANA Wczesna



KORZYŚCI

WYSOKI POTENCJAŁ PLONOWANIA
i szybkie dosychanie

BARDZO DOBRY PROFIL AGRONOMICZNY
wysoka tolerancja na głownię i fuzariozy

IDEALNA DO UPRAWY
w północnych regionach kraju

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
101%	103%	104%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	80 000

DYSTRYBUCJA



Agrosimex

Zeskanuj kod i skontaktuj się
z dystrybutorem.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
PL 2022

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 880°C; ziarno 32% H₂O: 1640°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PLONU




Rzędy/kolbę
16-18

Ziaren/rząd
26-28

MTZ
300

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2023 r. Grupa wczesna.



Wzorzec: 110,5 dt/ha = 100%
LID1015C: 113,2 dt/ha = 102%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2023 r.

FRIENDLI CS

ODMIANA Wczesna



KORZYŚCI

DWUKIERUNKOWE UŻYTKOWANIE

wysoka strawność kiszonki i dobry plon ziarna

MOCNY WCZESNY WIGOR

ODPORNOŚĆ NA STRES CHŁODU I SUSZY
szczególnie w początkowych fazach wzrostu

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **nisko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **dość wolne**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
101%	101%	102%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	90 000

DYSTRYBUCJA

Osadkowski, Osadkowski-Cebulski

Zeskanuj kod
i skontaktuj się
z dystrybutorem.

ODMIANA


Typ mieszańca
pojedynczy (SC)Typ ziarniaka
flintRejestracja
EU 2019Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 860°C; ziarno 32% H₂O: 1640°C

STRUKTURA PLONU

Rzędy/kolbę
14Ziaren/rząd
30-32MTZ
310

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2019 r. Grupa wczesna.

Wzorzec: 102,0 dt/ha = 100%
Friendli CS: 106,1 dt/ha = 104%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2019 r.

IBARAMA

ODMIANA WCZESNA



KORZYŚCI

ODMIANA WCZESNA

z mocnym ziarnem typu dent

UNIWERSALNA

na każde stanowisko glebowe

REKORDZISTKA PLONOWANIA

w grupie wczesnej – trzy lata z rzędu

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
103%	103%	104%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
PL 2024

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 860°C; ziarno 32% H₂O: 1690°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PLONU



Rzędy/kolbę
14-16



Ziaren/rząd
32-34




MTZ
380

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2025 r. Grupa wczesna.

NR 1 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA	NR 1 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA	NR 1 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA
PDO 2025 GR. WCZESNA	PDO 2024 GR. WCZESNA	DOŚW. REJESTROWE 2022-2023 GR. WCZESNA



Wzorzec: 115,4 dt/ha = 100%

Ibarama: 122,2 dt/ha = 106%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2025 r.

LID1033C

ODMIANA Wczesna



KORZYŚCI

ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ NA SŁABYCH STANOWISKACH

DOSKONAŁY PROFIL AGRONOMICZNY

wysoka zdrowotność roślin

SZYBKIE DOSYCHANIE ZIARNA

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysokie**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **b. szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **b. tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
111%	106%	102%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA

PUH Chemirol, Napena, Flora

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.



ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
flint-dent

Rejestracja
PL 2025

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 880°C; ziarno 32% H₂O: 1650°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PŁONU




Rzędy/kolbę
16-18

Ziaren/rząd
32-34

MTZ
300

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2024 r. Grupa wczesna.



Wzorzec: 128,3 dt/ha = 100%
LID1033C: 131,6 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, 2024 r.

LID1447C (LDZ25160)

ODMIANA Wczesna



KORZYŚCI

BARDZO DOBRE WYNIKI WYDAJNOŚCI ZIARNOWEJ

110% wzorca, w pierwszym roku doświadczeń rejestrowych

MOŻLIWOŚĆ DWUKIERUNKOWEGO UŻYTKOWANIA

WYSOKIE ROŚLINY

z niską podatnością na wyleganie

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
103%	106%	103%
NORMA SIEWU		
70 000	75 000	82 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
flint-dent

Rejestracja
Spodziewana – PL 2027

Suma temperatur efektywnych:

kwitnienie: 850°C; ziarno 32% H₂O: 1660°C; kiszonka 32% s.m.: 1450°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PŁONU




Rzędy/kolbę
12-14

Ziaren/rząd
32-34

MTZ
334

PŁONOWANIE

Płon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2025 r. Grupa wczesna.



Wzorzec: 115,2 dt/ha = 100%
LID1447C (LDZ25160): 127,0 dt/ha = 110%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, 2025 r.

ROCHESTER

ODMIANA Wczesna



KORZYŚCI

ODMIANA UNIWERSALNA

świetnie nadaje się również do uprawy na słabszych stanowiskach

DOSKONAŁY PROFIL AGRONOMICZNY

wysoka tolerancja na choroby

NADAJE SIĘ DO UPRAWY WE WSZYSTKICH REGIONACH KRAJU

nie tylko na ziarno, ale i na kiszonkę

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysokie**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **b. tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **b. tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
104%	102%	100%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
trójliniowy (TC)

Typ ziarniaka
flint-dent

Rejestracja
PL 2025

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 860°C; ziarno 32% H₂O: 1650°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PŁONU




Rzędy/kolbę
16-18

Ziaren/rząd
29-31

MTZ
300

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2024 r. Grupa wczesna.



Wzorzec: 128,3 dt/ha = 100%
Rochester: 131,6 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, 2024 r.



CS LUXURI

ODMIANA Wczesna



KORZYŚCI

DOBRA ADAPTACJA

do słabszych stanowisk

NISKIE I ZDROWE ROŚLINY

WYSOKA WARTOŚĆ PRZEMIAŁOWA

do produkcji grysu

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **niskie**
- Osadzenie kolby: **nisko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **dość wolne**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **b. tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
101%	101%	101%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	90 000

DYSTRYBUCJA



Grupa PSR:

Adler Agro, Agro Sieć, Agrochest, AgroAs

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
flint

Rejestracja
EU 2021

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 820°C; ziarno 32% H₂O: 1620°C

STRUKTURA PLONU




Rzędy/kolbę
12-14

Ziaren/rząd
28-30

MTZ
360

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2020 r. Grupa wczesna.



Wzorzec: 111,4 dt/ha = 100%

CS Luxuri: 111,3 dt/ha = 100%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2020 r.

LID1244C

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

OGROMNY POTENCJAŁ PLONOWANIA
na dobrych i średnich stanowiskach

BARDZO SZYBKE ODDAWANIE WODY
z ziarna

ROŚLINY WYSOKIE
ale odporne na wyleganie

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
105%	108%	106%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	85 000

DYSTRYBUCJA



Procama Polska

Zeskanuj kod i skontaktuj się
z dystrybutorem.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
flint-dent

Rejestracja
PL 2024

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 880°C; ziarno 32% H₂O: 1680°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PLONU



Rzędy/kolbę
14-16



Ziaren/rząd
28-30




MTZ
345

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2024 r. Grupa średniowczesna.

NR 1 NAJWYŻSZY
PLON ZIARNA
DOŚW. REJESTROWE 2022-2023
GR. ŚREDNIOWCZESNA



Wzorzec: 126,6 dt/ha = 100%
LID1244C: 130,5 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2024 r.



CHIANTI CS

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

BARDZO WYSOKA

wartość przemiałowa

ODMIANA DOSKONAŁA

na słabsze stanowiska

ZDROWE ROŚLINY

niska podatność na fuzariozy i głównie kukurydzy

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **niskie**
- Osadzenie kolby: **b. nisko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **dość wolne**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **b. tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
104%	101%	98%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	90 000

DYSTRYBUCJA



Grupa PSR:

Adler Agro, Agro Sieć, Agrochest, AgroAs

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
flint

Rejestracja
EU 2020

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 870°C; ziarno 32% H₂O: 1670°C

STRUKTURA PLONU



Rzędy/kolbę
14

Ziaren/rząd
31-33


MTZ
290

PLONOWANIE

Plon oraz wilgotność ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % H₂O).

Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2019 r.

Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 116,0 dt/ha = 100%

Chianti CS: 114,8 dt/ha = 99%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2019 r.

ES CREATIVE

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

WYSOKIE ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNE

i tolerancja na stres

„DRY DOWN”

doskonałe dosychanie ziarna na polu i podczas suszenia

NISKA PODATNOŚĆ NA WYLEGANIE

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
103%	102%	98%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
EU 2014

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 900°C; ziarno 32% H₂O: 1670°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana dostępna w zaprawie



STRUKTURA PŁONU




Rzędy/kolbę
14-16

Ziaren/rząd
27-29

MTZ
339

PLONOWANIE

Plon oraz wilgotność ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % H₂O).
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK 2017 r.
Grupa średniowczesna.



Plon ziarna:

- Wzorzec: 118,3 dt/ha = 100%
- ES Creative: 121,9 dt/ha = 103%

Wilgotność ziarna:

- Wzorzec: 28,2% H₂O
- ES Creative: 28,5% H₂O

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2017 r.



NOWOŚĆ

FAO 240

Lidea

IBEMA

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

ODMIANA WYSOKO WYDAJNA

idealna do użytkowania na mocnych stanowiskach

SZYBKE ODDAWANIE WODY Z ZIARNA

BARDZO ZDROWE ROŚLINY

z niską podatnością na wyleganie

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **b. tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
97%	108%	107%
NORMA SIEWU		
70 000	75 000	82 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
PL 2026

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 880°C; ziarno 32% H₂O: 1780°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PLONU




Rzędy/kolbę
14-16

Ziaren/rząd
26-28

MTZ
343

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, lata 2024-2025. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 128,3 dt/ha = 100%

Ibema: 131,6 dt/ha = 103%

*wynik tylko z roku 2025

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, lata 2024-2025.

ES INVENTIVE

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

DOSKONAŁE WYKORZYSTUJE POTENCJAŁ
najlepszych stanowisk

ZIARNO DENT

bardzo szybko dosycha

WYSOKA ODPORNOŚĆ

na głównie kukurydzy

ROŚLINY

**MORFOLOGIA**

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**

**PROFIL AGRONOMICZNY**

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**

**PROFIL ODPORNOŚCIOWY**

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
99%	102%	102%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA



Agrii Polska

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
PL 2018

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 910°C; ziarno 32% H₂O: 1680°C

Genetyka Tropical Dent®



STRUKTURA PLONU



Rzędy/kolbę
16-18



Ziaren/rząd
28-30



MTZ
293

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2020 r. Grupa średniowczesna.

NR 1 NAJWYŻSZY
PLON ZIARNA


PDO 2020
GR. ŚREDNIOWCZESNA

NR 1 NAJWYŻSZY
PLON ZIARNA

PDO 2018
GR. ŚREDNIOWCZESNA

NR 1 NAJNIŻSZA
WILGOTNOŚĆ

PDO 2018
GR. ŚREDNIOWCZESNA



Wzorzec: 121,4 dt/ha = 100%

ES Inventive: 125,1 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2020 r.

KEYSTONE

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

ODMIANA UNIWERSALNA

na wszystkie stanowiska glebowe

BARDZO NISKA PODATNOŚĆ

na złamanie i wylęganie roślin

SZYBKIE DOSYCHANIE ZIARNA

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wylęganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wylęganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
102%	102%	102%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
PL 2025

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 890°C; ziarno 32% H₂O: 1720°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PLONU




Rzędy/kolbę
14-16

Ziaren/rząd
33-35

MTZ
330

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, lata 2023-2024. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 129,0 dt/ha = 100%
Keystone: 133,2 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, lata 2023-2024.

LID2020C

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

PLON WYSOKI I STABILNY
na wszystkich stanowiskach

NISKA PODATNOŚĆ
na głównię kukurydzy

MOCNY EFEKT STAY GREEN

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wylęganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wylęganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
101%	108%	105%
NORMA SIEWU		
75 000	85 000	85 000

DYSTRYBUCJA

PUH Chemirol, Napena, Flora

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.



ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
PL 2023

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 880°C; ziarno 32% H₂O: 1680°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PLONU




Rzędy/kolbę
14-16

Ziaren/rząd
29-31

MTZ
340

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2025 r. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 118,3 dt/ha = 100%

LID2020C: 121,9 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2025 r.

LID2123C

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

WYSOKI POTENCJAŁ PLONOWANIA

w szczególności na stanowiskach średnich i dobrych

MOCNY WCZESNY WIGOR

NISKO ZAWIESZONA KOLBA

niska podatność na wyleganie

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **nisko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **średnio tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
97%	102%	103%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	85 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent-flint

Rejestracja
EU 2024

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 875°C; ziarno 32% H₂O: 1700°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PLONU




Rzędy/kolbę
16-18

Ziaren/rząd
28-30

MTZ
325

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, lata 2022-2023. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 118,3 dt/ha = 100%
LID2123C: 118,4 dt/ha = 100%

* wynik tylko z 2022 r.

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, lata 2022-2023.

LID2210C

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

IDEALNA PROPOZYCJA
na słabsze stanowiska

BARDZO SZYBKIE ODDAWANIE WODY
z ziarna

WYSOKA TOLERANCJA
na warunki suszy

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **b. szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
110%	108%	103%
NORMA SIEWU		
80 000	80 000	80 000

DYSTRYBUCJA



Scandagra Polska

Zeskanuj kod i skontaktuj się
z dystrybutorem.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
flint-dent

Rejestracja
PL 2022

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 890°C; ziarno 32% H₂O: 1670°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PLONU



Rzędy/kolbę
14-16



Ziaren/rząd
26-28



MTZ
320

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2022 r. Grupa średniowczesna.

NR 1 NAJNIŻSZA
WILGOTNOŚĆ


PDO 2024
GR. ŚREDNIOWCZESNA

NR 1 NAJWYŻSZY
PLON ZIARNA

PDO 2022
GR. ŚREDNIOWCZESNA

NR 1 NAJNIŻSZA
WILGOTNOŚĆ

PDO 2022
GR. ŚREDNIOWCZESNA



Wzorzec: 111,7 dt/ha = 100%
LID2210C: 118,1 dt/ha = 106%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2022 r.

LID2214C

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

ODMIANA DOBRZE SPISUJE SIĘ NA SŁABSZYCH STANOWISKACH

DOSKONAŁA ZDROWOTNOŚĆ

niska podatność na głównię kukurydzy

DOSKONAŁE ODDAWANIE WODY Z ZIARNA

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **b. szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **b. tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
104%	100%	102%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA

Osadkowski, Osadkowski-Cebulski



Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
PL 2025

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 880°C; ziarno 32% H₂O: 1700°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PLONU




Rzędy/kolbę
14-16

Ziaren/rząd
30-32

MTZ
305

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2025 r. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 118,3 dt/ha = 100%
LID2214C: 120,6 dt/ha = 102%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2025 r.

• NOWOŚĆ

FAO 240

Lidea

LID2233C

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

ODMIANA UNIWERSALNA
na każde stanowisko glebowe

DOBRE ZNOSI WARUNKI SUSZY

BARDZO SZYBKIE ODDAWANIE WODY

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **dość wolny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
102%	103%	103%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA



Grupa PSR:
Adler Agro, Agro Sieć,
Agrochest, AgroAs
Zeskanuj kod i skontaktuj się
z dystrybutorem.

ODMIANA



Typ mieszańca
trójliniowy (TC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
PL 2026

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 890°C; ziarno 32% H₂O: 1730°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PŁONU




Rzędy/kolbę
14-16

Ziaren/rząd
27-29

MTZ
352

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, lata 2024-2025. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 124,4 dt/ha = 100%
LID2233C (LDZ23239): 129,1 dt/ha = 104%

* wynik tylko z 2025 r.

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, lata 2024-2025.



ZIARNO

KATALOG KUKURYDZA 2027

LID2288C

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

WYSOKIE WYNIKI PLONOWANIA
szczególnie na słabych stanowiskach

BARDZO SZYBKE TEMPO ODDAWANIA WODY Z ZIARNA

DOBRZE SPRAWDZA SIĘ W UPRAWIE W WARUNKACH SUSZY

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
108%	102%	101%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	85 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent-flint

Rejestracja
PL 2024

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 890°C; ziarno 32% H₂O: 1720°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PLONU




Rzędy/kolbę
16-18

Ziaren/rząd
26-28

MTZ
340

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2024 r. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 126,6 dt/ha = 100%
LID2288C: 130,2 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2024 r.

MOONFIELD (LDZ25290)

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

STABILNY I WYSOKI PŁON ZIARNA

w różnych warunkach

BARDZO NISKA PODATNOŚĆ

na porażenie kolb przez głównię i Fusarium

NISKA PODATNOŚĆ ROŚLIN

na wyleganie

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średniowysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
105%	102%	103%
NORMA SIEWU		
70 000	78 000	82 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
flint-dent

Rejestracja
Spodziewana – PL 2027

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 880°C; ziarno 32% H₂O: 1740°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PŁONU




Rzędy/kolbę
14-16

Ziaren/rząd
40-42

MTZ
234

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2025 r. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 119,4 dt/ha = 100%

Moonfield (LDZ25290): 122,5 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, 2025 r.

TONIFI CS

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ W TRUDNYCH WARUNKACH UPRAWY
i na słabszych stanowiskach

MOCNY WCZESNY WIGOR
oraz wysoka odporność na wyleganie

BARDZO WYSOKI PLON ZIARNA
w grupie średniowczesnej

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **nisko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Dosychanie ziarna: **średnie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
103%	100%	98%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	80 000

DYSTRYBUCJA



Procam Polska

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
flint

Rejestracja
EU 2017

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 885°C; ziarno 32% H₂O: 1650°C

Odmiana dostępna w zaprawie

Boost & Go
Lidea BIRD

STRUKTURA PLONU




Rzędy/kolbę
14

Ziaren/rząd
30-32

MTZ
318

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK 2017 r. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 118,3 dt/ha = 100%

Tonifi CS: 127,3 dt/ha = 108%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2017 r.

ROCKHAMPTON

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

ODMIANA DOSKONAŁE WYKORZYSTUJĄCA DOBRE STANOWISKA

sprawdza się również na słabszych

TOLERANCJA NA OKRESOWE NIEDOBORY WODY

BARDZO NISKA PODATNOŚĆ NA WYLEGANIE
pomimo wysokich roślin

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **b. tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
101%	102%	102%
NORMA SIEWU		
80 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
trójliniowy (TC)

Typ ziarniaka
flint-dent

Rejestracja
PL 2025

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 875°C; ziarno 32% H₂O: 1690°C

Odmiana w zaprawie

Boost & Go
Lidea PRIME

STRUKTURA PLONU



Rzędy/kolbę
14-16


Ziaren/rząd
28-30

MTZ
365

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2025 r. Grupa średniowczesna.

NR **3** NAJWYŻSZY
PLON ZIARNA
PDO 2025
GR. ŚREDNIOWCZESNA



Wzorzec: 118,3 dt/ha = 100%

Rockhampton: 123,0 dt/ha = 104%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU/PZPK, 2025 r.



ARBORI CS

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

WYSOKI PŁON ZIARNA

i stabilność plonowania

BRAK PODATNOŚCI NA WYLEGANIE

WYSOKA ODPORNOŚĆ

na choroby fuzaryjne kolb

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **niskie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysokie**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **dość wolny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **b. tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **b. tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **b. tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
101%	104%	104%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
EU 2019

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 900°C; ziarno 32% H₂O: 1680°C

Odmiana dostępna w zaprawie



STRUKTURA PŁONU




Rzędy/kolbę
16-18

Ziaren/rząd
29-31

MTZ
320

PŁONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK lata 2020-2021.
Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 130,6 dt/ha = 100%
Arbori CS: 134,3 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, lata 2020-2021.

GRIGRI CS

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

TOLERANCJA NA STRES SUSZY
i chłód

STABILNE PLONOWANIE
również w trudnych warunkach

WYSOKIE WŁAŚCIWOŚCI PRZEMIAŁOWE

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Dosychanie ziarna: **średnie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
106%	104%	102%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA

PUH Chemirol, Napena, Flora

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.



ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
flint

Rejestracja
PL 2020

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 890°C; ziarno 32% H₂O: 1690°C

Odmiana dostępna w zaprawie

Boost & Go
Lidea BIRD

STRUKTURA PLONU




Rzędy/kolbę
14-16

Ziaren/rząd
31-33

MTZ
352

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2020 r. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 121,4 dt/ha = 100%

Grigri CS: 124,8 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2020 r.

KINGSTONE

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

DOSKONAŁE WYKORZYSTUJE POTENCJAŁ
najlepszych stanowisk

ZIARNO TYPU DENT
szybko oddaje wodę

WYSOKA TOLERANCJA NA SUSZĘ

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **nisko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **dość wolny**
- Dosychanie ziarna: **b. szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
99%	103%	103%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
PL 2024

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 900°C; ziarno 32% H₂O: 1680°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PLONU



Rzędy/kolbę
14-16


Ziaren/rząd
33-35

MTZ
350

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2024 r. Grupa średniowczesna.

NR 2 NAJWYŻSZY
PLON ZIARNA
DOŚW. REJESTROWE 2022-2023
GR. ŚREDNIOWCZESNA



Wzorzec: 126,6 dt/ha = 100%
Kingstone: 130,7 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2024 r.

LID2404C

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

MOŻLIWOŚĆ DWUKIERUNKOWEGO
UŻYTKOWANIA

na ziarno i kiszonkę

BARDZO DOBRE PARAMETRY PRZEMIAŁOWE

MOCNY WCZESNY WIGOR

bezpieczne wschody

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **bardzo nisko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **dość wolne**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wylęganie korzeniowe: **średnio tolerancyjna**
- Wylęganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
98%	100%	101%
NORMA SIEWU		
75 000	82 000	86 000

DYSTRYBUCJA



Grupa PSR:

Adler Agro, Agro Sieć,
Agrochest, AgroAsZeskanuj kod i skontaktuj się
z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca
pojedynczy (SC)Typ ziarniaka
flintRejestracja
EU 2023Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 850°C; ziarno 32% H₂O: 1720°C


Odmiana w zaprawie

Boost & Go
Lidea PRIME

STRUKTURA PŁONU

Rzędy/kolbę
16-18Ziaren/rząd
30-32MTZ
360

PŁONOWANIE

Płon oraz wilgotność ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % H₂O).
Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2022 r. Grupa średniowczesna.Wzorzec = 116,2 dt/ha = 100%
LID2404C = 114,0 dt/ha = 98%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, 2022 r.



NOWOŚĆ

FAO 240-250

Lidea

OKLAHOMA

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

BARDZO WYSOKI POTENCJAŁ PŁONOWANIA
szczególnie na słabych stanowiskach

BARDZO DOBRY PROFIL ODPORNOŚCIOWY
niska podatność na głównię oraz fuzariozy kolb i łodyg

ROŚLINY WYSOKIE
ale mało podatne na wyleganie

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **b. tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
110%	102%	103%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA



Agrolok

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
PL 2026

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 890°C; ziarno 32% H₂O: 1750°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PŁONU



Rzędy/kolbę
14-16


Ziaren/rząd
32-34

MTZ
315

PŁONOWANIE

Płon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe, lata 2024-2025. Grupa średniowczesna.

NR 1 NAJWYŻSZY PŁON ZIARNA
DOŚW. REJESTROWE 2024-2025
GR. ŚREDNIOWCZESNA



Wzorzec: 124,4 dt/ha = 100%

Oklahoma: 134,4 dt/ha = 108%

* wynik tylko z 2025 r.

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, lata 2024-2025.

LID2155C

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

DOSKONAŁA KOMBINACJA ODDAWANIA WODY

i wysokiego potencjału plonowania

ŚWIETNY EFEKT STAY GREEN

ROŚLINY STABILNE

nie podatne na wyleganie

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **b. tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
106%	103%	103%
NORMA SIEWU		
78 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA



Agrii Polska

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca
pojedynczy (SC)Typ ziarniaka
dentRejestracja
PL 2024Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 900°C; ziarno 32% H₂O: 1750°C

Genetyka Tropical Dent®




STRUKTURA PLONU



PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2025 r. Grupa średniowczesna.

NR 1 NAJWYŻSZY PLOD ZIARNA	NR 1 NAJWYŻSZY PLOD ZIARNA	NR 3 NAJWYŻSZY PLOD ZIARNA
PDO 2025 GR. ŚREDNIOWCZESNA	PDO 2024 GR. ŚREDNIOWCZESNA	DOŚW. REJESTROWE 2022-2023 GR. ŚREDNIOWCZESNA



Wzorzec: 118,2 dt/ha = 100%
LID2155C: 124,9 dt/ha = 106%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2025 r.

REDFORD

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

MOŻLIWOŚĆ UPRAWY
na słabszych stanowiskach

SZYBKE DOSYCHANIE ZIARNA

ROŚLINY WYSOKIE
ale mało podatne na wyleganie

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
103%	106%	100%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
PL 2026

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 890°C; ziarno 32% H₂O: 1760°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana dostępna w zaprawie



STRUKTURA PLONU



Rzędy/kolbę
16-18

Ziaren/rząd
28-30


MTZ
330

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, lata 2024-2025. Grupa średniowczesna.

**NR 1 NAJWYŻSZY
PLON ZIARNA**

DOŚW. REJESTROWE 2024
GR. ŚREDNIOWCZESNA



Wzorzec: 124,4 dt/ha = 100%
Redford: 133,2 dt/ha = 107%

* wynik tylko z 2025 r.

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, lata 2024-2025.

ES HATTRICK

ODMIANA ŚREDNIOPÓŻNA



KORZYŚCI

BARDZO SZYBKIE ODDAWANIE WODY Z ZIARNA

DOSKONAŁA ZDROWOTNOŚĆ
oraz odporność na wyleganie

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **niskie**
- Osadzenie kolby: **nisko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **b. szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **b. tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **b. tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
105%	102%	100%
NORMA SIEWU		
70 000	75 000	80 000

DYSTRYBUCJA

Osadkowski, Osadkowski-Cebulski



Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent


Rejestracja
PL 2020

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 900°C; ziarno 32% H₂O: 1800°C

Genetyka Tropical Dent®



STRUKTURA PLONU



Rzędy/kolbę
16-18


Ziaren/rząd
28-30

MTZ
350

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2020 r. Grupa średniopóźna.

NR 1 NAJWYŻSZY
PLON ZIARNA
PDO 2020
GR. ŚREDNIOPÓŻNA



Wzorzec: 127,8 dt/ha = 100%
ES Hattrick: 135,3 dt/ha = 106%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2020 r.



LID2334C

ODMIANA ŚREDNIOPÓŻNA



KORZYŚCI

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ ZIARNOWA

szczególnie na średnich i lepszych stanowiskach

BARDZO DOBRE ODDAWANIE WODY Z ZIARNA

NISKA PODATNOŚĆ

na wylęganie i głównię kukurydzy

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **b. szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wylęganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wylęganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
100%	103%	101%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
EU 2025

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 900°C; ziarno 32% H₂O: 1790°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PLONU




Rzędy/kolbę
14-16

Ziaren/rząd
32-34

MTZ
350

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2023 r. Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 136,6 dt/ha = 100%
LID2334C: 141,7 dt/ha = 104%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, 2023 r.

LID3306C

ODMIANA ŚREDNIOPÓŻNA



KORZYŚCI

UNIWERSALNOŚĆ

do uprawy na każdym stanowisku

REGULARNE ROŚLINY

również pod względem plonowania

ŚWIETNE I BARDZO SZYBKIE
DOSYCHANIE ZIARNA

na tle odmian średniopóźnych

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **b. szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
102%	105%	103%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	85 000

DYSTRYBUCJA



Agrosimex

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca
pojedynczy (SC)Typ ziarniaka
dent-flintRejestracja
PL 2022Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 890°C; ziarno 32% H₂O: 1720°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie




STRUKTURA PLONU

Rzędy/kolbę
16-18Ziaren/rząd
30-32MTZ
385

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2024 r. Grupa średniopóźna.

NR 1 NAJNIŻSZA WILGOTNOŚĆ	NR 2 NAJWYŻSZY PLON ZIARNA	NR 1 NAJNIŻSZA WILGOTNOŚĆ
PDO 2024 GR. ŚREDNIOPÓŻNA	PDO 2024 GR. ŚREDNIOPÓŻNA	PDO 2023 GR. ŚREDNIOPÓŻNA

Wzorzec: 133,6 dt/ha = 100%
LID3306C: 139,1 dt/ha = 104%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2024 r.



• NOWOŚĆ

FAO 260

Lidea

LID3355C (LDZ25364)

ODMIANA ŚREDNIOPÓŻNA



KORZYŚCI

WYSOKI POTENCJAŁ PŁONU ZIARNA
w zmiennych warunkach pogodowych

DOBRE ZABEZPIECZENIE PŁONU
w warunkach niedoboru wody

MOCNY WCZESNY WIGOR
bardzo szybki start wegetacji

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
104%	102%	104%
NORMA SIEWU		
75 000	78 000	82 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
Spodziewana –
EU 2027; PL 2028

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 880°C; ziarno 32% H₂O: 1780°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PŁONU




Rzędy/kolbę
14-16

Ziaren/rząd
29-31

MTZ
356

PŁONOWANIE

Płon ziarna w % wzorca na terenie całej Europy (% wzorca/liczba doświadczeń). Doświadczenia wewnętrzne LIDEA Development, lata 2024-2025.



ES MYLADY

ODMIANA ŚREDNIOPÓŻNA



KORZYŚCI

STABILNOŚĆ PLONOWANIA

w każdych warunkach

DOSYCHANIE ZIARNA NA POLU

i dosuszanie w suszarni

DOBRY WCZESNY WIGOR

i efekt stay green

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
105%	103%	100%
NORMA SIEWU		
70 000	75 000	80 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
EU 2020

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 900°C; ziarno 32% H₂O: 1790°C

Genetyka Tropical Dent®



STRUKTURA PLONU



Rzędy/kolbę
14-16

Ziaren/rząd
28-30


MTZ
320

PLONOWANIE

Plon ziarna w województwach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2022 r. Grupa średniopóźna.

NR **3** NAJWYŻSZY
PLON ZIARNA
PDO 2022
GR. ŚREDNIOPÓŻNA

NR **1** NAJWYŻSZY
PLON ZIARNA
CCA 2021
GR. ŚREDNIOPÓŻNA



Wzorzec: 114,9 dt/ha = 100%
ES Mylady: 118,7 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2022 r.

LID3223C

ODMIANA ŚREDNIOPÓŻNA



KORZYŚCI

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ ZIARNOWA

szczególnie na średnich i lepszych stanowiskach

BARDZO DOBRE ODDAWANIE WODY Z ZIARNA

NISKA PODATNOŚĆ NA WYLEGANIE

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Dosychanie ziarna: **b. szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
101%	100%	106%
NORMA SIEWU		
75 000	82 000	87 000

DYSTRYBUCJA

PUH Chemirol, Napena, Flora

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.



ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
EU 2025

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 890°C; ziarno 32% H₂O: 1820°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PLONU




Rzędy/kolbę
16-18

Ziaren/rząd
29-31

MTZ
370

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2024 r. Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 131,8 dt/ha = 100%

LID3223C: 130,6 dt/ha = 99%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, 2024 r.

WINTERSTONE

ODMIANA ŚREDNIOPÓŻNA



KORZYŚCI

BARDZO WYSOKI POTENCJAŁ PLONOWANIA
szczególnie na dobrych stanowiskach glebowych

NISKA PODATNOŚĆ

na porażenie kolb przez fusariozę

NISKA PODATNOŚĆ

na wyleganie

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **dość wolny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE Yield PROFILE®		
99%	103%	103%
NORMA SIEWU		
75 000	80 000	80 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
PL 2024

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 900°C; ziarno 32% H₂O: 1820°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PLONU




Rzędy/kolbę
16-18

Ziaren/rząd
33-35

MTZ
330

PLONOWANIE

Plon oraz wilgotność ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % H₂O).
Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2023 r. Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 136,6 dt/ha = 100%
Winterstone: 138,6 dt/ha = 101%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, 2023 r.



LID4040C

ODMIANA PÓŹNA



KORZYŚCI

DOBRA ADAPTACJA
do słabszych stanowisk

BARDZO MOCNY WCZESNY WIGOR

**MOŻLIWOŚĆ DWUKIERUNKOWEGO
UŻYTKOWANIA**
na ziarno i kiszonkę

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **tolerancyjna**
- Głownia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
103%	100%	101%
NORMA SIEWU		
75 000	78 000	82 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
flint-dent

Rejestracja
EU 2022

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 920°C; ziarno 32% H₂O: 1810°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PLONU




Rzędy/kolbę
14-16

Ziaren/rząd
31-33

MTZ
380

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2024 r. Grupa późna.



Wzorzec: 144,1 dt/ha = 100%
LID4040C: 148,0 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2024 r.

LID4111C

ODMIANA PÓŻNA



KORZYŚCI

BARDZO WYSOKI POTENCJAŁ PLONOWANIA
wybitny na dobrych stanowiskach

ŚWIETNY PROFIL AGRONOMICZNY
typowo ziarnowy pokrój roślin

SZYBKIE DOSYCHANIE ZIARNA

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **b. tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **b. tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
102%	104%	104%
NORMA SIEWU		
72 000	75 000	80 000

DYSTRYBUCJA

Osadkowski, Osadkowski-Cebulski



Zeskanuj kod
i skontaktuj się
z dystrybutorem.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
EU 2024

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 930°C; ziarno 32% H₂O: 1820°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PLONU




Rzędy/kolbę
16-18

Ziaren/rząd
27-29

MTZ
380

PLONOWANIE

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca). Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2024 r. Grupa późna.



Wzorzec: 144,1 dt/ha = 100%
LID4111C: 145,5 dt/ha = 101%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2024 r.



NOWOŚĆ

FAO 290

Lidea

LID4320C

ODMIANA PÓŹNA



KORZYŚCI

OGROMNY POTENCJAŁ PLONOWANIA
na najlepszych stanowiskach

SZYBKE ODDAWANIE WODY Z ZIARNA

KORZYSTNY POKRÓJ ROŚLIN
z nisko osadzoną kolbą

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **niskie**
- Osadzenie kolby: **nisko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **wolny**
- Dosychanie ziarna: **szybkie**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **b. tolerancyjna**
- Wyleganie przed zbiorem: **b. tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
100%	101%	105%
NORMA SIEWU		
70 000	75 000	80 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
dent

Rejestracja
EU 2024

Suma temperatur efektywnych: kwitnienie: 940°C; ziarno 32% H₂O: 1850°C

Genetyka Tropical Dent®



Odmiana w zaprawie



STRUKTURA PLONU




Rzędy/kolbę
16-18

Ziaren/rząd
25-27

MTZ
342

PLONOWANIE

Plon oraz wilgotność ziarna w lokalizacjach (dt/ha / % H₂O).
Doświadczenia własne Lidea, 2025 r. Grupa późna.



Źródło: Wyniki doświadczeń własnych LIDEA, 2025 r.

CS SOREMI

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

WYSOKI PLON KISZONKI

103% wzorca w plonie suchej masy (CCA 2022)

WYSOKI PLON ZIARNA

101% wzorca w plonie ziarna (CCA 2022)

SZEROKIE LIŚCIE I WYSOKI UDZIAŁ LIŚCI W PLONIE OGÓLNYM

gwarantują wysoką strawność włókna

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Stay green: **mocny**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **b. tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
96%	104%	102%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	90 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
flint

Rejestracja
EU 2021

Suma temperatur efektywnych:

kwitnienie: 860°C; kiszonka 32% s.m.: 1510°C; ziarno 32% H₂O: 1650°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE

Plon kiszonki



Zawartość skrobi




Strawność włókna



PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2022 r.
Grupa wczesna.

**NR 2 NAJWYŻSZY
PLON S.M.**
CCA 2022
GR. WCZESNA



Wzorzec: 203,1 dt/ha = 100%
CS Soremi: 208,9 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2022 r.



GREYSTONE

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

ŚWIETNA ODMIANA DLA ZABEZPIECZENIA BAZY PASZOWEJ

wysokie zbiory świeżej i suchej masy – nr 2 w Polsce w doświadczeniach CCA 2023

BARDZO WYSOKA WYDAJNOŚĆ BIOGAZU

12527 m³/ha (wg doświadczeń wewnętrznych Development LIDEA)

WYSOKIE MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI ZIARNA

FLINT W SPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH

kolby o ciekawym kształcie

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **b. wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Stay green: **mocny**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **średnio tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE 		
		
99%	102%	104%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	93 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
trójliniowy (TC)

Typ ziarniaka
flint

Rejestracja
EU 2023

Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 860°C; kiszonka 32% s.m.: 1470°C

Odmiana dostępna w zaprawie



UŻYTKOWANIE KISZONKOWE

Plon kiszonki



Zawartość skrobi




Strawność włókna



PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2023 r.
Grupa średniowczesna.

NR **2** NAJWYŻSZY
PLON S.M.
CCA 2023
GR. ŚREDNIOWCZESNA



Wzorzec: 177,6 dt/ha = 100%
Greystone: 189,0 dt/ha = 106%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2023 r.

FIELDPLAYER

ODMIANA Wczesna



KORZYŚCI

NAJWCZEŚNIEJSZA ODMIANA KISZONKOWA W POLSCE

przebadana w COBORU w latach 2022-2023

NADAJE SIĘ DO UPRAWY NA KAŻDYM STANOWISKU

również w trudnych warunkach

SZYBKİ START

we wczesnych fazach rozwojowych

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysokie**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Stay green: **b. mocny**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
107%	104%	104%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	90 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
flint

Rejestracja
PL 2022

Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 870°C; kiszonka 32% s.m.: 1400°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE

Plon kiszonki



Zawartość skrobi



Strawność włókna




PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w województwach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2023 r.
Grupa wczesna.

NR 1 NAJWYŻSZY
PLON S.M.
PDO 2023
GR. WCZESNA

NR 1 NAJWYŻSZY
PLON S.M.
DOŚW. REJESTROWE 2020-2021
GR. WCZESNA



Wzorzec: 179,1 dt/ha = 100%
Fieldplayer: 183,5 dt/ha = 102%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2023 r.



ES JOKER

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

ODMIANA UNIWERSALNA

również do uprawy na ziarno – plon ponad 100% wzorca na lepszych stanowiskach glebowych

SPRAWDZA SIĘ W UPRAWIE NA KISZONKĘ

nawet na najsłabszych glebach

DOBRE PARAMETRY JAKOŚCIOWE

wysoka strawność włókna

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Stay green: **mocny**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **średnio tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
100%	102%	102%
NORMA SIEWU		
80 000	87 000	90 000

DYSTRYBUCJA



Agrosimex

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA

Typ mieszańca
pojedynczy (SC)Typ ziarniaka
flintRejestracja
PL 2019

Suma temperatur efektywnych:

kwitnienie: 860°C; kiszonka 32% s.m.: 1490°C; ziarno 32% H₂O: 1700°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE

Plon kiszonki



Zawartość skrobi



Strawność włókna




PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w województwach (dt/ha / % wzorca).

Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2020 r.

Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 207,2 dt/ha = 100%

ES Joker: 210,3 dt/ha = 102%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2020 r.

LID2929C (LDZ24269)

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

MAKSYMALIZACJA PLONÓW KISZONKI

na większości stanowisk glebowych

WYSOKA ZAWARTOŚĆ SKROBI

z ziarna typu flint w kiszonce

MOCNY START

mocny wczesny wigor roślin

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysokie**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Stay green: **średni**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
102%	102%	105%
NORMA SIEWU		
85 000	90 000	95 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
trójliniowy (TC)

Typ ziarniaka
flint

Rejestracja
Spodziewana – PL 2027

Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 860°C; kiszonka 32% s.m.: 1480°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE

Plon kiszonki



Zawartość skrobi




Strawność włókna



PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2025 r. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 190,2 dt/ha = 100%
LID2929C (LDZ24269): 194,0 dt/ha = 102%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, 2025 r.



ES ISLANDER

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

ŚWIETNA PROPOZYCJA

na słabsze stanowiska glebowe

STRAWNOŚĆ WŁOKNA

nawet 51% (wg doświadczeń wewnętrznych Development LIDEA)

SZYBKİ START

we wczesnych fazach rozwojowych

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **nisko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Stay green: **mocny**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **średnio tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
102%	102%	99%
NORMA SIEWU		
80 000	83 000	85 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
flint

Rejestracja
PL 2021

Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 850°C; kiszonka 32% s.m.: 1540°C

Odmiana dostępna w zaprawie

Boost&Go
Lidea BIRD

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE

Plon kiszonki



Zawartość skrobi




Strawność włókna



PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia rejestrowe COBORU, lata 2019-2020.
Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 183,8 dt/ha = 100%
ES Islander: 191,7 dt/ha = 104%

* wynik tylko z 2020 roku

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, lata 2019-2020.

• NOWOŚĆ

FAO 240-250

Lidea



KISZONKA

LID2775C

(LDZ25285)

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

ODMIANA UNIWERSALNA

do produkcji na kiszonkę, ziarno i grys

WYSOKI PŁON I STRAWNOŚĆ KISZONKI

MOCNY WCZESNY WIGOR ROŚLIN

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysokie**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Stay green: **bardzo mocny**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **średnio tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE 		
		
101%	104%	105%
NORMA SIEWU		
75 000 ziarno 78 000 kiszonka	78 000 ziarno 85 000 kiszonka	82 000 ziarno 90 000 kiszonka

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
trójliniowy (TC)

Typ ziarna
flint

Rejestracja
Spodziewana –
PL 2027

Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 870°C; kiszonka 32% s.m.: 1490°C; ziarno 32% H₂O: 1770°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE

Płon kiszonki



Zawartość skrobi




Strawność włókna



PŁONOWANIE

Płon ogólny suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia rejestrowe COBORU, 2025 r. Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 190,2 dt/ha = 100%
LID2775C (LDZ25285): 197,9 dt/ha = 104%

Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU, 2025 r.

KATALOG KUKURYDZA 2027



LID2888C

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

WYKAZUJE WYSOKĄ TOLERANCJĘ

na warunki suszy i opóźnione siewy

WYSOKA ENERGETYCZNOŚĆ KISZONKI

Netto Energia Laktacji (NEL) – 6,7 MJ/kg s.m. – jedna z najwyższych wartości w doświadczeniach Development LIDEA 2023

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **słaby**
- Stay green: **mocny**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
104%	103%	102%
NORMA SIEWU		
85 000	87 000	97 000

DYSTRYBUCJA



Grupa PSR:

Adler Agro, Agro Sieć,
Agrochest, AgroAs

Zeskanuj kod i skontaktuj się
z dystrybutorem.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
flint

Rejestracja
EU 2023

Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 920°C; kiszonka 32% s.m.: 1500°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE

Plon kiszonki



Zawartość skrobi



Strawność włókna




PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca).

Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2023 r.

Grupa średniowczesna.



Wzorzec: 177,6 dt/ha = 100%

LID2888C: 185,6 dt/ha = 105%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2023 r.

IMPAKTIT

ODMIANA ŚREDNIOWCZESNA



KORZYŚCI

DOBRY I BEZPIECZNY WYBÓR

na słabsze stanowiska glebowe

WYSOKA ENERGETYCZNOŚĆ KISZONKI

Netto Energia Laktacji (NEL) – 7,1 MJ/kg s.m. – jedna z najwyższych wartości w doświadczeniach Development LIDEA

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Stay green: **mocny**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
NORMA SIEWU		
80 000	83 000	90 000

DYSTRYBUCJA



Elmar Pro

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA



Typ mieszańca
trójliniowy (TC)

Typ ziarniaka
flint

Rejestracja
EU 2022

Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 880°C; kiszonka 32% s.m.: 1450°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE

Plon kiszonki



Zawartość skrobi




Strawność włókna



PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy oraz zawartość suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % s.m.). Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2022 r. Grupa średniowczesna.

NR **2** NAJWYŻSZY
PLON S.M.
CCA 2022
GR. ŚREDNIOWCZESNA



Wzorzec: 218,4 dt/ha = 100%
Impaktit: 223,4 dt/ha = 102%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2022 r.



BAOBI CS

ODMIANA ŚREDNIOPÓŻNA



KORZYŚCI

DOSKONAŁA STRAWNOŚĆ

gwarantująca efektywne żywienie

MOŻLIWOŚĆ ZBIORU RÓWNIEŻ NA ZIARNO

na każdym stanowisku glebowym

WYSOKI PLON ZIARNA

doskonałe źródło skrobi, czyli energii

ODMIANA UNIWERSALNA

na każde stanowisko glebowe

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Stay green: **mocny**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **b. tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
101%	102%	103%
NORMA SIEWU		
75 000	85 000	95 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarna
flint

Rejestracja
EU 2018

Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 880°C; kiszonka 32% s.m.: 1560°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE

Plon kiszonki



Zawartość skrobi




Strawność włókna



PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w województwach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK 2020 r. Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 232,8 dt/ha = 100%
Baobi CS: 241,9 dt/ha = 104%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2020 r.

CS KISSMI

ODMIANA ŚREDNIOPÓŻNA



KORZYŚCI

WYSOKIE I ULISTNIONE ROŚLINY

gwarancja wysokiego plonu i wysokiej strawności

ZDROWE ROŚLINY I KOLBY

zdrowa i bezpieczna kiszzonka

WYSOKI UDZIAŁ ZIARNA TYPU FLINT

wysoka zawartość skrobi – możliwość uprawy również na ziarno

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Stay green: **b. mocny**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
99%	106%	103%
NORMA SIEWU		
75 000	82 000	90 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarna
flint

Rejestracja
EU 2020

Suma temperatur efektywnych:

kwitnienie: 890°C; kiszonka 32% s.m.: 1570°C

Odmiana dostępna w zaprawie

Boost & Go
Lidea BIRD

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE

Plon kiszonki



Zawartość skrobi




Strawność włókna



PLONOWANIE

Plon ogólny świeżej masy w lokalizacjach (dt/ha). Doświadczenia rozpoznawcze, COBORU/PZPK, 2021 r. Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 679,7 dt/ha = 100%
CS Kissmi: 697,7 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2021 r.



ES SKYTOWER

ODMIANA ŚREDNIOPÓŻNA



KORZYŚCI

NAJWYŻSZA ODMIANA NA RYNKU

średnio 375 cm (wg Doświadczeń wewnętrznych Development LIDEA)

ODMIANA O WYJĄTKOWEJ I SPECYFICZNEJ GENETYCE TYPU „LEAFY”

nawet do 20 liści na roślinie – wyjątkowy pokrój i wygląd roślin, a przede wszystkim gwarancja wysokich zbiorów

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **b. wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Stay green: **mocny**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: średnio **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
101%	105%	112%
NORMA SIEWU		
85 000	90 000	90 000

DYSTRYBUCJA

Osadkowski, Osadkowski-Cebulski



Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarna
flint

Rejestracja
PL 2022

Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 900°C; kiszonka 32% s.m.: 1570°C

Odmiana dostępna w zaprawie

Boost&Go
Lidea BIRD

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE

Plon kiszonki



Zawartość skrobi



Strawność włókna



PLONOWANIE


Plon ogólny suchej masy w województwach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK 2024 r.
Grupa średniopóźna.

NR 1 NAJWYŻSZY PLON S.M.

PDO 2022
GR. ŚREDNIOPÓŻNA

NR 1 NAJWYŻSZY PLON S.M.

DOŚW. REJESTROWE 2020-2021
GR. ŚREDNIOPÓŻNA



Wzorzec: 197,7 dt/ha = 100%
ES Skytower: 213,4 dt/ha = 108%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2024 r.

ROLLINGSTONE

ODMIANA ŚREDNIOPÓŻNA



KORZYŚCI

WYSOKA ENERGETYCZNOŚĆ KISZONKI
UFL = 0,93 (wg doświadczeń wewnętrznych Development LIDEA)

DOBRE SPRAWDZA SIĘ W UPRAWIE NA SŁABSZYCH STANOWISKACH

GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI KISZONKI
zarówno energii, jak i strawności

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: średnio **wysokie**
- Osadzenie kolby: średnio **wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Stay green: **średni**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
102%	102%	99%
NORMA SIEWU		
80 000	87 000	90 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
trójliniowy (TC)

Typ ziarniaka
flint

Rejestracja
EU 2023

Suma temperatur efektywnych:

kwitnienie: 890°C; kiszonka 32% s.m.: 1510°C

Odmiana dostępna w zaprawie

Boost & Go
Lidea BIRD

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE

Plon kiszonki



Zawartość skrobi




Strawność włókna



PLONOWANIE

Plon ogólny świeżej masy oraz zawartość suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % s.m.). Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, lata 2020-2021. Grupa średniopóźna.



Plon ś.m.: 612,7 dt/ha
Zawartość s.m.: 31,4%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, lata 2020-2021.



CS ALCHIMI

ODMIANA ŚREDNIOPÓŻNA



KORZYŚCI

WYSOKA ENERGETYCZNOŚĆ KISZONKI

Netto Energia Laktacji (NEL) 6,7 MJ/kg s.m.
(wg doświadczeń wewnętrznych Development LIDEA)

SZEROKIE LIŚCIE

wysoki udział liści w plonie ogólnym – wysoka strawność włókna

ODMIANA UNIWERSALNA

nadaje się do uprawy na wszystkich typach gleb – gwarantuje szybki start roślin

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Stay green: **b. mocny**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **średnio tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
99%	106%	103%
NORMA SIEWU		
80 000	87 000	95 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
trójliniowy (TC)

Typ ziarniaka
flint

Rejestracja
EU 2021

Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 900°C; kiszonka 32% s.m.: 1540°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE

Plon kiszonki



Zawartość skrobi




Strawność włókna



PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy (dt/ha / % wzorca) w lokalizacjach.
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2022 r.
Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 208,9 dt/ha = 100%
CS Alchimi: 215,0 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2022 r.



LID3620C

ODMIANA ŚREDNIOPÓŻNA



KORZYŚCI

IDEALNA GWARANCJA ZABEZPIECZENIA
BAZY PASZOWEJ W GOSPODARSTWIE

potwierdzona czołowymi wynikami plonowania
w doświadczeniach COBORU (1 i 3 miejsce)
w latach 2021-2023

BARDZO WYSOKA ZAWARTOŚĆ SKROBI
W KISZONCE

34,5% (wg doświadczeń wewnętrznych
Development LIDEA)

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **nisko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Stay green: **mocny**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **średnio tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE 		
		
101%	103%	104%
NORMA SIEWU		
80 000	82 000	85 000

DYSTRYBUCJA



Agrii Polska

Zeskanuj kod i skontaktuj się
z dystrybutorem.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
flint

Rejestracja
PL 2023

Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 910°C; kiszonka 32% s.m.: 1550°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE

Plon kiszonki



Zawartość skrobi



Strawność włókna




PLONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w województwach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2023 r.
Grupa średniopóźna.

NR **3** NAJWYŻSZY
PLON S.M.
PDO 2023
GR. ŚREDNIOPÓŻNA

NR **1** NAJWYŻSZY
PLON S.M.
DOŚW. REJESTROWE 2021-2022
GR. ŚREDNIOPÓŻNA



Wzorzec: 184,8 dt/ha = 100%
LID3620C: 190,0 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2023 r.



• NOWOŚĆ

FAO 260

Lidea

LID3641C (LDZ23345)

ODMIANA ŚREDNIOPÓŻNA



KORZYŚCI

ZABEZPIECZENIE WYSOKIEGO PŁONU KISZONKI**NADAJE SIĘ DO UPRAWY**
na słabszych stanowiskach**ZDROWE ROŚLINY, ZDROWE LIŚCIE**

ROŚLINY

**MORFOLOGIA**

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **nisko**

**PROFIL AGRONOMICZNY**

- Wczesny wigor: **średni**
- Stay green: **mocny**

**PROFIL ODPORNOŚCIOWY**

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
102%	101%	101%
NORMA SIEWU		
80 000	85 000	87 000

DYSTRYBUCJA

Zeskanuj kod i skontaktuj się
z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA

**Typ mieszańca**
pojedynczy (SC)**Typ ziarniaka**
flint**Rejestracja**
EU 2026Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 880°C; kiszonka 32% s.m.: 1520°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE

Plon kiszonki



Zawartość skrobi



Strawność włókna



BELLWOOD

ODMIANA ŚREDNIOPÓŻNA



KORZYŚCI

GWARANCJA WYSOKIEGO PŁONU ŚWIEŻEJ I SUCHEJ MASY

nr 1 w Polsce w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2023-2024

WYSOKA STRAWNOŚĆ WŁÓKNA

51,1% (wg doświadczeń wewnętrznych Development LIDEA)

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Stay green: **mocny**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **średnio tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
98%	106%	105%
NORMA SIEWU		
80 000	90 000	95 000

DYSTRYBUCJA

PUH Chemirol, Napena, Flora

Zeskanuj kod i skontaktuj się z dystrybutorem.



ODMIANA

Typ mieszańca
trójliniowy (TC)Typ ziarniaka
flint-dentRejestracja
PL 2025

Suma temperatur efektywnych:

kwitnienie: 890°C; kiszzonka 32% s.m.: 1540°C

Odmiana w zaprawie

Boost & Go
Lidea PRIME

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE

Plon kiszonki



Zawartość skrobi




Strawność włókna



PŁONOWANIE

Plon ogólny suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia porejestrowe COBORU/PZPK, 2025 r.
Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 184,6 dt/ha = 100%

Bellwood: 194,1 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU/PZPK, 2025 r.



LID3910C

ODMIANA ŚREDNIOPÓŻNA



KORZYŚCI

WYSOKA STRAWNOŚĆ WŁÓKNA

50,4% (wg doświadczeń wewnętrznych Development LIDEA)

WYSOKI PŁON ŚWIEŻEJ MASY I BOGATE ULISTNIENIE

bardzo szerokie liście

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Stay green: **średni**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **średnio tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **średnio tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
102%	101%	100%
NORMA SIEWU		
80 000	87 000	92 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
trójliniowy (TC)

Typ ziarniaka
flint

Rejestracja
EU 2023

Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 900°C; kiszonka 32% s.m.: 1540°C

Odmiana w zaprawie

Boost&Go
Lidea PRIME

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE

Płon kiszonki



Zawartość skrobi




Strawność włókna



PŁONOWANIE

Płon ogólny oraz zawartość suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % s.m.). Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2025 r. Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 189,3 dt/ha = 100%
LID3910C: 189,0 dt/ha = 100%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2025 r.

OVERSTONE

ODMIANA ŚREDNIOPÓŻNA



KORZYŚCI

WYSOKA STRAWNOŚĆ WŁÓKNA

50,5% (wg doświadczeń wewnętrznych Development LIDEA 2022-2023)

BEZPIECZNA PROPOZYCJA DLA UPRAWY

na stanowiskach zagrożonych suszą

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **średni**
- Stay green: **średni**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **średnio tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
100%	101%	102%
NORMA SIEWU		
78 000	85 000	90 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
trójliniowy (TC)

Typ ziarniaka
flint

Rejestracja
EU 2023

Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 920°C; kiszonka 32% s.m.: 1560°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE

Plon kiszonki



Zawartość skrobi




Strawność włókna



PLONOWANIE

Plon ogólny oraz zawartość suchej masy w lokalizacjach (dt/ha / % s.m.). Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK, 2025 r. Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 178,3 dt/ha = 100%
Overstone: 184,2 dt/ha = 103%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2025 r.



POESI CS

ODMIANA ŚREDNIOPÓŻNA



KORZYŚCI

WYSOKA ENERGETYCZNOŚĆ KISZONKI

Netto Energia Laktacji (NEL) 6,5 MJ/kg s.m.
(wg doświadczeń wewnętrznych Development LIDEA)

DOBRZE SIĘ SPRAWDZA

również w uprawie na słabszych stanowiskach

DOSKONAŁY BALANS

strawności oraz zawartości skrobi

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **średnio wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **b. mocny**
- Stay green: **mocny**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **b. tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **b. tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE		
102%	101%	100%
NORMA SIEWU		
75 000	85 000	90 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
trójliniowy (TC)

Typ ziarniaka
flint

Rejestracja
EU 2017

Suma temperatur efektywnych:

kwitnienie: 890°C; kiszonka 32% s.m.: 1540°C; ziarno 32% H₂O: 1750°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE

Plon kiszonki



Zawartość skrobi




Strawność włókna



PLONOWANIE

Plon ogólny świeżej masy w lokalizacjach (dt/ha / % wzorca).
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK 2018 r.
Grupa średniopóźna.



Wzorzec: 636,0 dt/ha = 100%
Poesi CS: 669,0 dt/ha = 105%

Źródło: Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK, 2018 r.

NAOMI CS

ODMIANA ŚREDNIOPÓŻNA



KORZYŚCI

WYSOKI PLON

zielonej i suchej masy

BARDZO NISKA PODATNOŚĆ NA WYLEGANIE

NADAJE SIĘ DO UPRAWY NA WSZYSTKICH
STANOWISKACH GLEBOWYCH

szczególnie słabszych

ROŚLINY



MORFOLOGIA

- Wysokość roślin: **średnio wysokie**
- Osadzenie kolby: **wysoko**



PROFIL AGRONOMICZNY

- Wczesny wigor: **mocny**
- Stay green: **mocny**



PROFIL ODPORNOŚCIOWY

- Wyleganie korzeniowe: **b. tolerancyjna**
- Głównia kukurydzy: **tolerancyjna**
- Fusarium kolb: **b. tolerancyjna**

WYMAGANIA GLEBOWE

stanowisko słabe	stanowisko średnie	stanowisko dobre
DOPASOWANIE 		
		
102%	101%	99%
NORMA SIEWU		
75 000	82 000	82 000

DYSTRYBUCJA



Zeskanuj kod i skontaktuj się
z przedstawicielem Lidea.

ODMIANA



Typ mieszańca
pojedynczy (SC)

Typ ziarniaka
flint-dent

Rejestracja
EU 2019

Suma temperatur efektywnych:
kwitnienie: 980°C; kiszonka 32% s.m.: 1620°C; ziarno 32% H₂O: 1860°C

UŻYTKOWANIE KISZONKOWE

Plon kiszonki



Zawartość skrobi



Strawność włókna



SPIS ODMIAN KUKURYDZY

ODMIANA	FAO	ZALECANE UŻYTKOWANIE	TYP ZIARNA	REJ.	CECHY AGRONOMICZNE							
					WYSOKOŚĆ ROŚLIN	MTZ	WCZESNY WIGOR	STAY GREEN	ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE	TOLERANCJA NA SUSZĘ	ODPORNOŚĆ: GŁÓWNI KUKURYDZY	ODPORNOŚĆ: FUSARIUM KOLB
CS ALCHIMI	260	kiszonka, biogaz	flint	EU 2021	6	5	7	9	7	8	8	7
ARBORI CS	240-250	ziarno, bioetanol	dent	EU 2019	4	6	6	8	9	8	8	9
BAOBI CS	250-260	kiszonka, biogaz	flint	EU 2018	8	5	8	8	9	8	8	8
BELLWOOD	260-270	kiszonka, biogaz	flint-dent	PL 2025	7	7	9	8	8	8	8	7
CHIANTI CS	240	ziarno, grys	flint	EU 2020	7	7	8	7	8	8	9	8
ES CREATIVE	240	ziarno, bioetanol	dent	EU 2014	5	6	7	7	8	9	9	8
FIELDPLAYER	230	kiszonka, biogaz	flint	PL 2022	9	7	7	9	7	8	8	7
FRIENDLI CS	220	ziarno, kiszonka, grys	flint	EU 2019	7	5	8	6	7	7	8	7
GREYSTONE	240-250	ziarno, kiszonka, biogaz, grys	flint	EU 2023	9	7	7	8	7	7	6	7
GRIGRI CS	240-250	ziarno, grys	flint	PL 2020	6	9	9	7	8	7	7	7
ES HATTRICK	260	ziarno, bioetanol	dent	PL 2020	5	8	7	8	9	9	8	7
HEMINGSTONE	220	ziarno, bioetanol	flint-dent	EU 2025	7	8	7	8	8	8	9	9
IBARAMA	230	ziarno, bioetanol	dent	PL 2024	9	9	7	8	7	8	7	8
IBEMA	240	ziarno, bioetanol	dent	PL 2026	9	8	6	8	8	7	8	8
IMPAKTIT	250	kiszonka, biogaz	flint	EU 2022	7	8	7	8	8	8	7	8
ES INVENTIVE	240	ziarno, bioetanol	dent	PL 2018	8	7	9	9	8	9	9	8
ES ISLANDER	240-250	kiszonka, biogaz	flint	PL 2021	8	8	9	8	7	8	8	7
ES JOKER	240	kiszonka, ziarno, bioetanol, grys	flint	PL 2019	9	9	8	8	7	8	8	6
KEYSTONE	240	ziarno, bioetanol	dent	PL 2025	8	8	7	8	8	7	7	8
KINGSTONE	240-250	ziarno, bioetanol	dent	PL 2024	8	8	7	8	8	9	8	8
CS KISSMI	250-260	kiszonka, biogaz	flint	EU 2020	7	6	9	9	8	8	8	8

NORMA WYSIEWU			DOPASOWANIE DO STANOWISKA			DYSTRYBUCJA W POLSCE	NUMER STRONY
STANOWISKA SŁABE	STANOWISKA ŚREDNIE	STANOWISKA DOBRE	STANOWISKA SŁABE	STANOWISKA ŚREDNIE	STANOWISKA DOBRE		
80 000	87 000	95 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	66
75 000	80 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	36
75 000	85 000	95 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	62
80 000	90 000	95 000				Chemiroł Sp. z o.o.; tel. 52 31 88 843 Napena Sp. z o.o.; tel. 61 29 20 108 Flora Sp. z o.o.; tel. 34 359 18 29	69
80 000	85 000	90 000				Adler Agro Sp. z o.o.; tel. 85 741 86 50 Agro-Sieć Sp. z o.o.; tel. 56 677 04 60 Agrochest Sp. z o.o.; tel. 61 818 88 88 AgroAs Sp. z o.o. sp.k.; tel. 77 41 55 700	22
75 000	80 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	23
80 000	85 000	90 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	55
80 000	85 000	90 000				Osadkowski; tel. 71 314 64 54 Osadkowski-Cebulski; tel. 76 850 61 49	15
80 000	85 000	93 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	54
75 000	80 000	85 000				Chemiroł Sp. z o.o.; tel. 52 31 88 843 Napena Sp. z o.o.; tel. 61 29 20 108 Flora Sp. z o.o.; tel. 34 359 18 29	37
70 000	75 000	80 000				Osadkowski; tel. 71 314 64 54 Osadkowski-Cebulski; tel. 76 850 61 49	43
75 000	80 000	82 000				BAT Agrar Sp. z o. o.; tel.: +48 728 994 104	13
75 000	80 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	16
70 000	75 000	82 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	24
80 000	83 000	90 000				Elmar-Pro Sp. z o.o.; tel. 54 284 84 98	61
75 000	80 000	85 000				Agrii Polska Sp. z o.o.; tel. 54 28 24 617	25
80 000	83 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	58
80 000	87 000	90 000				Agrosimex Sp. z o.o.; tel. 48 66 80 471	56
75 000	80 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	26
75 000	80 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	38
75 000	82 000	90 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	63

SPIS ODMIAN KUKURYDZY

ODMIANA	FAO	ZALECANE UŻYTKOWANIE	TYP ZIARNA	REJ.	CECHY AGRONOMICZNE							
					WYSOKOŚĆ ROŚLIN	MTZ	WCZESNY WIGOR	STAY GREEN	ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE	TOLERANCJA NA SUSZĘ	ODPORNOŚĆ: GŁÓWNIĄ KUKURYDZY	ODPORNOŚĆ: FUSARIUM KOLB
LID1015C	220	ziarno, bioetanol	dent	PL 2022	8	6	7	8	8	8	9	8
LID1033C	230	ziarno, bioetanol	flint-dent	PL 2025	8	6	7	7	8	8	9	9
LID1145C	210	ziarno, kiszonka, bioetanol	dent	PL 2023	7	6	7	9	8	8	8	7
LID1244C	230-240	ziarno, bioetanol	flint-dent	PL 2024	8	8	9	8	7	8	9	7
LID1447C (LDZ25160)	230	ziarno, kiszonka	flint-dent	Spodziewana – PL 2027	9	7	7	8	8	8	8	8
LID2020C	240	ziarno, bioetanol	dent	PL 2023	7	7	8	9	8	8	9	8
LID2123C	240	ziarno, bioetanol	dent-flint	EU 2024	9	7	9	8	7	8	8	7
LID2155C	250	ziarno, bioetanol	dent	PL 2024	7	8	6	9	9	7	7	6
LID2210C	240	ziarno, bioetanol	flint-dent	PL 2022	7	6	8	9	8	9	8	7
LID2214C	240	ziarno, bioetanol	dent	PL 2025	6	7	7	8	9	8	9	7
LID2233C	240	ziarno, bioetanol	dent	PL 2026	8	8	6	8	8	8	7	8
LID2288C	240	ziarno, bioetanol	dent-flint	PL 2024	8	7	7	7	8	8	8	7
LID2334C	260	ziarno, bioetanol	dent	EU 2025	8	7	8	7	9	8	8	8
LID2404C	240-250	ziarno, kiszonka, grys	flint	EU 2023	8	9	9	7	6	7	7	8
LID2775C (LDZ25285)	240-250	ziarno, kiszonka, biogaz, grys	flint	Spodziewana – PL 2027	8	4	8	8	7	7	8	8
LID2888C	240-250	kiszonka, biogaz	flint	EU 2023	8	7	6	8	8	9	8	7
LID2929C (LDZ24269)	240	kiszonka, biogaz	flint	Spodziewana – PL 2027	9	4	8	7	7	8	8	8
LID3223C	270	ziarno, bioetanol	dent	EU 2025	9	7	8	7	8	8	8	7

NORMA WYSIEWU			DOPASOWANIE DO STANOWISKA			DYSTRYBUCJA W POLSCE	NUMER STRONY
STANOWISKA SŁABE	STANOWISKA ŚREDNIE	STANOWISKA DOBRE	STANOWISKA SŁABE	STANOWISKA ŚREDNIE	STANOWISKA DOBRE		
75 000	80 000	80 000				Agrosimex Sp. z o.o.; tel. 48 66 80 471	14
75 000	80 000	85 000				Chemirol Sp. z o.o.; tel. 52 31 88 843 Napena Sp. z o.o.; tel. 61 29 20 108 Flora Sp. z o.o.; tel. 34 359 18 29	17
80 000	85 000	90 000				Agrii Polska Sp. z o.o.; tel. 54 28 24 617	12
80 000	85 000	85 000				ProCam Polska Sp. z o.o.; tel. 58 76 28 039	21
70 000	75 000	82 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	18
75 000	85 000	85 000				Chemirol Sp. z o.o.; tel. 52 31 88 843 Napena Sp. z o.o.; tel. 61 29 20 108 Flora Sp. z o.o.; tel. 34 359 18 29	27
80 000	85 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	28
78 000	80 000	85 000				Agrii Polska Sp. z o.o.; tel. 54 28 24 617	41
80 000	80 000	80 000				Scandagra Polska Sp. z o.o.; tel. 52 32 57 333	29
75 000	80 000	85 000				Osadkowski; tel. 71 314 64 54 Osadkowski-Cebulski; tel. 76 850 61 49	30
75 000	80 000	85 000				Adler Agro Sp. z o.o.; tel. 85 741 86 50 Agro-Sieć Sp. z o.o.; tel. 56 677 04 60 Agrochest Sp. z o.o.; tel. 61 818 88 88 AgroAs Sp. z o.o. sp.k.; tel. 77 41 55 700	31
80 000	85 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	32
75 000	80 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	44
75 000	82 000	86 000				Adler Agro Sp. z o.o.; tel. 85 741 86 50 Agro-Sieć Sp. z o.o.; tel. 56 677 04 60 Agrochest Sp. z o.o.; tel. 61 818 88 88 AgroAs Sp. z o.o. sp.k.; tel. 77 41 55 700	39
75 000 (Z) 78 000 (K)	78 000 (Z) 85 000 (K)	82 000 (Z) 90 000 (K)				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	59
85 000	87 000	97 000				Adler Agro Sp. z o.o.; tel. 85 741 86 50 Agro-Sieć Sp. z o.o.; tel. 56 677 04 60 Agrochest Sp. z o.o.; tel. 61 818 88 88 AgroAs Sp. z o.o. sp.k.; tel. 77 41 55 700	60
85 000	90 000	95 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	57
75 000	82 000	87 000				Chemirol Sp. z o.o.; tel. 52 31 88 843 Napena Sp. z o.o.; tel. 61 29 20 108 Flora Sp. z o.o.; tel. 34 359 18 29	48

SPIS ODMIAN KUKURYDZY

ODMIANA	FAO	ZALECANE UŻYTKOWANIE	TYP ZIARNA	REJ.	CECHY AGRONOMICZNE							
					WYSOKOŚĆ ROŚLIN	MTZ	WCZESNY WIGOR	STAY GREEN	ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE	TOLERANCJA NA SUSZĘ	ODPORNOŚĆ: GŁOWNIA KUKURYDZY	ODPORNOŚĆ: FUSARIUM KOLB
LID3306C	260	ziarno, bioetanol	dent-flint	PL 2022	8	9	8	7	8	7	8	6
LID3355C (LDZ25364)	260	ziarno, bioetanol	dent	Spodziewana – EU 2027, PL 2028	8	8	9	8	7	8	7	8
LID3620C	260	kiszonka, biogaz	flint	PL 2023	8	6	8	8	7	8	6	8
LID3641C (LDZ23345)	260	kiszonka, biogaz	flint	EU 2026	7	6	9	7	8	8	8	7
LID3910C	270	kiszonka, biogaz	flint	EU 2023	8	7	8	7	7	8	7	8
LID4040C	280	ziarno, bioetanol	flint-dent	EU 2022	8	9	9	6	8	8	7	8
LID4111C	280	ziarno, bioetanol	dent	EU 2024	5	8	6	6	8	8	8	7
LID4320C	290	ziarno, bioetanol	dent	EU 2024	5	8	5	6	9	7	8	7
CS LUXURI	230	ziarno, grys	flint	EU 2021	6	8	8	7	8	8	7	7
MOONFIELD (LDZ25290)	240	ziarno	flint-dent	Spodziewana – PL 2027	7	4	7	7	8	8	8	8
ES MYLADY	270	ziarno, bioetanol	dent	EU 2020	6	7	9	9	8	9	9	8
NAOMI CS	280	kiszonka	flint-dent	EU 2019	7	7	8	8	9	8	8	9
OKLAHOMA	240-250	ziarno, bioetanol	dent	PL 2026	8	7	9	9	9	8	9	8
OVERSTONE	270	kiszonka, biogaz	flint	EU 2023	7	7	7	7	7	9	9	8
POESI CS	270	kiszonka, ziarno, biogaz	flint	EU 2017	7	6	9	8	8	8	9	9
REDFORD	250	ziarno, bioetanol	dent	PL 2026	8	7	7	7	8	8	7	7
ROCHESTER	230	ziarno, kiszonka, bioetanol	flint-dent	PL 2025	8	6	8	8	9	8	9	7
ROCKHAMPTON	240	ziarno, bioetanol	flint-dent	PL 2025	8	6	9	8	9	8	7	8
ROLLINGSTONE	250-260	kiszonka, biogaz	flint	EU 2023	7	9	7	7	8	9	6	7
ES SKYTOWER	250-260	kiszonka, biogaz	flint	PL 2022	9	6	7	8	8	8	9	7
CS SOREMI	240	ziarno, kiszonka, grys	flint	EU 2021	8	6	8	8	9	7	8	8
TONIFI CS	240	ziarno, grys	flint	EU 2017	7	8	9	7	8	7	8	6
WINTERSTONE	270	ziarno, bioetanol	dent	PL 2024	8	7	6	7	8	7	7	8

NORMA WYSIEWU			DOPASOWANIE DO STANOWISKA			DYSTRYBUCJA W POLSCE	NUMER STRONY
STANOWISKA SŁABE	STANOWISKA ŚREDNIE	STANOWISKA DOBRE	STANOWISKA SŁABE	STANOWISKA ŚREDNIE	STANOWISKA DOBRE		
75 000	80 000	85 000				Agrosimex Sp. z o.o.; tel. 48 66 80 471	45
75 000	78 000	82 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	46
80 000	82 000	85 000				Agrii Polska Sp. z o.o.; tel. 54 28 24 617	67
80 000	85 000	87 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	68
80 000	87 000	92 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	70
75 000	78 000	82 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	50
72 000	75 000	80 000				Osadkowski; tel. 71 314 64 54 Osadkowski-Cebulski; tel. 76 850 61 49	51
70 000	75 000	80 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	52
80 000	85 000	90 000				Adler Agro Sp. z o.o.; tel. 85 741 86 50 Agro-Sieć Sp. z o.o.; tel. 56 677 04 60 Agrochest Sp. z o.o.; tel. 61 818 88 88 AgroAs Sp. z o.o. sp.k.; tel. 77 41 55 700	20
70 000	78 000	82 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	33
70 000	75 000	80 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	47
75 000	82 000	82 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	73
75 000	80 000	85 000				Agrolok Sp. z o.o.; tel. 56 68 23 888	40
78 000	85 000	90 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	71
75 000	85 000	90 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	72
75 000	80 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	42
75 000	80 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	19
80 000	80 000	85 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	35
80 000	87 000	90 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	65
85 000	90 000	90 000				Osadkowski; tel. 71 314 64 54 Osadkowski-Cebulski; tel. 76 850 61 49	64
80 000	85 000	90 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	53
75 000	80 000	80 000				ProCam Polska Sp. z o.o.; tel. 58 76 28 039	34
75 000	80 000	80 000				Skontaktuj się z przedstawicielem Lidea	49



Przedstawiciele handlowi

- | | | |
|---|--|--|
| 1 Sławomir Kowalczyk
+48 880 368 339
slawomir.kowalczyk@lidea-seeds.com | 2 Zadzwoń pod numer
+48 607 555 133 | 3 Emil Ropiak
+48 885 445 844
emil.ropiak@lidea-seeds.com |
| 4 Tomasz Rzeszot
+48 693 555 351
tomasz.rzeszot@lidea-seeds.com | 5 Magdalena Rzeszot
+48 691 555 087
magdalena.rzeszot@lidea-seeds.com | 6 Daniel Tadajewski
+48 605 444 027
daniel.tadajewski@lidea-seeds.com |
| 7 Maria Fligiel
+48 667 333 260
maria.fligiel@lidea-seeds.com | 8 Michał Pieprzka
+48 692 149 991
michal.pieprzka@lidea-seeds.com | 9 Andrzej Ptaszyński
+48 607 303 225
andrzej.ptaszynski@lidea-seeds.com |
| 10 Zadzwoń pod numer
+48 607 303 692 | 11 Zadzwoń pod numer
+48 669 333 227 | 12 Sylwia Świdarska
+48 887 999 322
sylwia.swiderska@lidea-seeds.com |
| 13 Bartosz Wierzbicki
+48 690 034 424
bartosz.wierzbicki@lidea-seeds.com | 14 Karol Cyrklewicz
+48 607 303 634
karol.cyrklewicz@lidea-seeds.com | |

Lidea

